

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

Ruthenium complexes useful as carriers for immunologically active materials

Patent Number: ☐ US4745076

Publication date: 1988-05-17

Inventor(s): MUELLER FRANCIS (CH); SCHMIDT DIETER (CH)

Applicant(s):: HOFFMANN LA ROCHE (US)

Requested
Patent: ☐ EP0178450, B1

Application
Number: US19850773956 19850909

Priority Number
(s): CH19850002984 19850710; CH19840004433 19840917

IPC
Classification:

EC
Classification: G01N33/533, C07F15/00N4B

Equivalents: AU4733485, AU586831, CA1261744, DE3582549D, DK365785, ☐ ES8705634,
JP1973814C, JP6090201B, ☐ JP61073066, NO163694B, NO163694C, NO853635,
NZ213420

Abstract

The invention relates to a ruthenium complex having the formula $Ru_2 + L_1L_2L_3I$ wherein L_1 , L_2 and L_3 are the same or different are equal to a bi- or polycyclic ligand with at least two nitrogen-containing heterocycles, whereby at least one of these ligands is substituted with at least one group conferring water-solubility, and whereby at least one of these ligands is substituted, optionally via a spacer group, with at least one reactive group, and whereby the ligands L_1 , L_2 and L_3 are attached to the ruthenium via nitrogen atoms. The invention is further related to such ruthenium complexes having coupled thereto an immunologically active material, for example, antigens, haptens or antibodies and to the use of said ruthenium complexes in fluorescence spectroscopy. Specific ligands L_1 , L_2 and L_3 which are useful in the ruthenium complexes of the invention are, e.g., 2,2'-bipyridine, 1,10-phenanthroline, benzobathophenanthroline or bathophenanthroline groups. Groups which are useful for conferring water-solubility on said ligand are, e.g. sulfonic acid groups which are preferably present in the form of their salts. Useful spacer groups are e.g. an alkylene group containing 1-8 carbon atoms and which is optionally substituted with -SO₂-NH-, -S-, -O-, -COO- or -CO-NH- groups. Useful reactive groups to which the immunologically active material is coupled, are e.g. -COOH, -I, -NH₂, -NCS or -SO₂Hal groups. The ruthenium complexes according to the present invention can be detected with great sensitivity by fluorescence spectroscopy and are thus useful in fluorescence immunoassays.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 85111377.9

(51) Int. Cl.⁴: **G01N 33/533**, **G01N 33/574**,
G01N 33/76, **C07F 15/00**

(22) Anmeldetag: 09.09.85

(30) Priorität: 17.09.84 CH 4433/84
10.07.85 CH 2984/85

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.04.86 Patentblatt 86/17

(64) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. Aktien-
gesellschaft

CH-4002 Basel(CH)

(72) Erfinder: Müller, Francis
Seltisbergerstrasse 18
CH-4059 Basel(CH)
Erfinder: Schmidt, Dieter, Dr.
Redingstrasse 20
CH-4052 Basel(CH)

(74) Vertreter: Lederer, Franz, Dr. et al
Patentanwalte Dr. Lederer Franz Meyer-Roxlau Rei-
ner F. Lucile-Grahn-Strasse 22
D-8000 München 80(DE)

(84) Metallkomplex, an die ein immunologisch aktives Material gekoppelt werden kann bzw. ist, deren Herstellung und Verwendung.

(87) Es werden Rutheniumkomplexe beschrieben, an die ein immunologisch aktives Material gekoppelt werden kann bzw. ist. Die Rutheniumkomplexe haben die allgemeine Formel



worin L_1 , L_2 und L_3 gleich oder verschieden sind und je einen bi- oder polycyclischen Liganden mit mindestens zwei stickstoffhaltigen Heterocyclen bedeuten, wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer wasserlöslich machenden Gruppe substituiert ist, und wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer reaktiven Gruppe, gegebenenfalls über eine Spacergruppe, substituiert ist, und wobei die Liganden L_1 , L_2 und L_3 über Stickstoffatome an das Ruthenium gebunden sind.

Die Liganden L_1 , L_2 und L_3 enthalten beispielsweise 2,2'-Bipyridin-, 1,10-Phenanthrolin-, Benzobiphenanthrolin- oder Bathophenanthrolingruppen.

Die Spacergruppe ist beispielsweise eine Alkylengruppe mit höchstens 8 C-Atomen, die gegebenenfalls -SO-, -NH-, -S-, -O-, -COO- oder -CO-NH- aufweisen kann.

Als reaktive Gruppen, an die das immunologisch aktive Material gebunden wird, kommen vorzugsweise -COOH, -J, -NH₂, -NCS oder -SO₂H-Gruppen in Betracht.

Als immunologisch aktive Materialien, welche an die vorerwähnten Rutheniumkomplexe gekoppelt sind, kommen insbesondere Antigene, Heptene oder Antikörper, z.B. Antikörper gegen carcinoembryonale Antigen, in Betracht.

Die Rutheniumkomplexe gemäss vorliegender Erfindung lassen sich fluoreszenzspektroskopisch sehr empfindlich nachweisen.

EP 0 178 450 A2

Metallkomplexe, an die ein immunologisch aktives Material gekoppelt werden kann bzw. ist, deren Herstellung und Verwendung

Die vorliegende Erfindung betrifft Rutheniumkomplexe, an die ein immunologisch aktives Material gekoppelt werden kann.

Die Rutheniumkomplexe weisen die allgemeine Formel $Ru^{2+}L_1L_2L_3$

1 auf, worin L_1 , L_2 und L_3 gleich oder verschieden sind und je einen bi- oder polycyclischen Liganden mit mindestens zwei stickstoffhaltigen Heterocyclen bedeuten, wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer wasserlöslich machenden Gruppe substituiert ist, und wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer reaktiven Gruppe, gegebenenfalls über eine Spacergruppe, substituiert ist, und wobei die Liganden L_1 , L_2 und L_3 über Stickstoffatome an das Ruthenium gebunden sind.

Die Liganden L_1 und L_2 können gleich oder verschieden sein und beispielsweise 2,2'-Bipyridin-, 1,10-Phenanthrolin-, Benzobathophenanthrolin- oder insbesondere Bathophenanthrolingruppen enthalten. Die Liganden L_1 und L_2 sind vorzugsweise gleich.

Als Gruppen, welche die Liganden wasserlöslich machen, kommen insbesondere Sulfonsäuregruppen in Betracht, die vorzugsweise in Form ihrer Salze vorliegen. Besonders bevorzugt sind hierbei die Natriumsalze.


Der Ligand L_3 enthält beispielsweise eine 2,2'-Bipyridin-, 1,10-Phenanthrolin- oder insbesondere eine Bathophenanthrolingruppe.

Die eingangs erwähnte Spacergruppe ist vorzugsweise eine Alkylengruppe mit höchstens 8 C-Atomen, die gegebenenfalls -SO₂-NH-, -S-, -O-, -COO- oder -CO-NH- aufweisen kann.

Als reaktive Gruppen, an die das immunologisch aktive Material gebunden wird, kommen vorzugsweise -COOH, -J, -NH₂, -NCS oder -SO₂ Hal Gruppen in Betracht.


Bei Ru-Komplexen mit 3 identischen Liganden L_1 , L_2 und L_3 muss der Ligand sowohl eine wasserlöslich machende Gruppe wie auch eine Spacergruppe mit reaktiver Gruppe aufweisen.

Ein hierfür geeigneter Ligand ist die Verbindung der Formel $[(SO_3Na)(SO_2NH-CH_2CH_2COOH)batho]$




Bei Ru-Komplexen, die zwei verschiedene Ligandtypen aufweisen, kann der eine Ligandtyp die wasserlöslich machende Gruppe oder Gruppen tragen, während der andere Ligandtyp über eine oder mehrere Linkinggruppen (reaktive Gruppe, die über einen Spacer an Heterocyclen gebunden ist) verfügt.


Als Liganden L_1 und L_2 eignen sich in diesem Falle vorzüglich die Gruppen der Formel



und als Ligand L_3 vorzugsweise die folgenden Gruppen $[(SO_3Na)(SO_2NH-CH_2CH_2COOH)batho]$




[(SO₂NH CH₂COOH),batho]




[(SO₂NH CH₂CH₂COOH),batho]

15




25

[(SO₂NH CH₂CH₂CH₂COOH),batho]




[(SO₂NH CH₂CH₂CH₂CH₂COOH),batho]

40



[(CH₂CH₂CH₂CH₂COOH)batho]


55




[(CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COOH)batho]

65


3



10

[(CH₂CH₂CH₂CH₂COOH)benzobatho]

26

[(COOH)₂bpy]


Die Synthese der Liganden L_n, welche die Linking Gruppe bzw. Gruppen tragen, erfolgt nach Verfahren, die nachfolgend schematisch beschrieben sind:

a) [(SO₂NH(CH₂)₅COO-t-butyl),batho] und [(SO₂Na)(SO₂NH(CH₂)₅COO-t-butyl),batho]

Bei der Synthese dieser Verbindungen geht man vom Dinatrium-Salz der Bathophenanthroline-disulfonsäure aus. Daraus stellt man mit PCl₅ zunächst das entsprechende Disulfonchlorid her (vgl. F. Muth in "Houben-Weyl, Methoden

der Organischen Chemie", Band IX, S. 563, 4. Auflage 1955, G. Thieme Verlag, Stuttgart). Dieses wird anschließend mit dem t-Butylester einer Aminosäure (wie z.B. β-Alanin, Glycin, 4-Aminobuttersäure oder 6-Aminocaproinsäure) gemäß folgendem Schema zum entsprechenden Sulfonamid umgesetzt (vgl. F. Muth in "Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie", Band IX, S. 609, 4. Auflage 1955, G. Thieme Verlag Stuttgart):

4



Bei dieser Reaktion entsteht neben dem Disulfonamid als Nebenprodukt immer auch noch das Monosulfonamid.

Die Verseifung der t-Butylester erfolgt erst nach der Synthese der entsprechenden Ru-Komplexe.

b) $[(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]$ bzw.

$[(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]$

Die Synthese dieser Liganden mit Valeriansäure bzw. Capronsäure als Linking-Gruppe erfolgt mittels Skraup'scher Reaktion (vgl. F.H. Case und P.F. Strohm; J.Org.Chem. 27, 1841 (1962)) aus 4-Phenyl-8-amino-chinolin (vgl. F.H. Case; J.Org.Chem. 16, 1541 (1951)) und den p

35

-[β -Chlorpropionyl]-Derivaten der entsprechenden α -Phenylfettsäuremethylester, wobei die letzteren durch Acylierung des 5-Phenyl valeriansäuremethylester (Fluka) bzw. des 6-Phenylcapronsäuremethylesters (vgl. W.E. Truce und C.E. Olson; J. Amer. Chem.Soc. 75, 1851 (1953)) mit β -Chlorpropionylchlorid gemäss nachfolgendem Reaktionsschema erhalten werden:

40

46

50

56

60


66

5

Reaktionsschema

c) [(CH₂CH₂CH₂CH₂COOH)benzobatho]

Die Synthese dieser Verbindung
(Benzo-bathophenanthrolin-pentansäure) erfolgt über meh-
rere Stufen aus 2-Amino-3-naphthoesäure gemäss folgen-
dem Schema (vgl. E. Kofl und F.H. Case; J.Org.Chem. 27,
5 885 (1962))



Für die Synthese von Ru-Komplexen mit 3 identischen Liganden werden in der Literatur 2 Verfahren beschrieben:

Nach Braddock und Meyer [J.Am.Chem.Soc. **85**, 3158 (1973)] erhitzt man wasserlösliches Rutheniumtrichlorid zusammen mit dem Liganden für längere Zeit in DMF, wobei sich der Komplex unter teilweiser Zersetzung des Lösungsmittels bildet.

Bevorzugt verwendet man jedoch das von Lin et al. [J.Am.Chem.Soc. **88**, 6538 (1976)] beschriebene Verfahren. Dabei erhitzt man Kaliumpentachloroauroruthenat ($K_3RuCl_5 \cdot H_2O$) in schwach saurer Umgebung mit der 3-fachen stöchiometrischen Menge an Ligand und reduziert anschliessend die Lösung mit Natriumhypophosphit.

Die Herstellung der Rutheniumkomplexe mit 2 verschiedenen Ligandtypen erfolgt nach literaturbekannten Methoden, z.B. gemäss Belser et al. Helv.Chim.Acta **63**, 1875 (1980).

Im Hinblick auf die Tatsache, dass bei diesen Komplexen der Ligand L_1 von den Liganden L_2 und L_3 verschieden ist, wird ein stufenweiser Aufbau des Komplexes bevorzugt. (Selbstverständlich könnte der Komplex auch mittels einer statistischen Synthese hergestellt werden, doch ist diese Möglichkeit nicht bevorzugt, da sie schwerer kontrollierbar ist.) Dabei wird in einer ersten Stufe mit wasserlöslichem Rutheniumtrichlorid und der doppelt stöchiometrischen Menge an Ligand L_1 bzw. L_2 in Dimethylformamid (mit Lithiumchlorid als Katalysator) das Zwischenprodukt $RuL_2L_1Cl_2$ hergestellt. Dieses Zwischenprodukt wird mit dem Liganden L_3 anschliessend zum gewünschten Komplex umgesetzt.

Wird als Ligand L_1 eine Verbindung verwendet, deren reaktive Gruppe in geschützter Form vorliegt - z.B. als t-Butylester bei den Sulfonamid-Derivaten des Bathophenanthrolins - so erfolgt die Abspaltung dieser Schutzgruppe bevorzugt erst nach der Synthese des entsprechenden Ru-Komplexes.

Die Isolierung und Reinigung der gebildeten Rutheniumkomplexe erfolgt nach herkömmlichen Methoden, durch Umfällen, Säulenchromatographie oder präparative Dickschichtchromatographie.

Als immunologisch aktive Materialien, welche an die vorerwähnten Rutheniumkomplexe gekoppelt sind, kommen insbesondere Antigene, Haptene oder Antikörper (inklusive, z.B. Fab-Fragmente) in Betracht. Als Antikörper können sowohl polyklonale wie monoklonale Antikörper verwendet werden.

Ein besonders bevorzugtes immunologisch aktives Material ist ein Antikörper gegen carcinoembryonales Antigen. Ein weiterhin besonders bevorzugtes immunologisch aktives Material ist ein Antikörper gegen menschliches Choriongonadotropin, sowie ein Antikörper gegen α -Interferon.

Die Kopplung des immunologischen Materials an den Rutheniumkomplex erfolgt in an sich bekannter Weise. Eine bevorzugte Kopplungsweise besteht darin, dass man den Rutheniumkomplex und das immunologisch aktive Material mit einem wasserlöslichem Carbodiimidderivat, z.B. mit N-Cyclohexyl-N'-(2-morpholinoäthyl)-carbodiimid methyl-p-toluolsulfonat behandelt.

Die Rutheniumkomplexe gemäss vorliegender Erfindung lassen sich fluoreszenzspektroskopisch sehr empfindlich nachweisen. Sie sind bestens geeignet als Markermoleküle für hochempfindliche Fluoreszenz-Immuno-Assays. Sie sind insbesondere geeignet für einen zeitaufgelösten Fluoreszenz-Immuno-Assay, wie er beispielsweise in der DT-OS 2628158 beschrieben wird. Durch die Verwendung der Rutheniumkomplexe gemäss vorliegender Erfindung anstelle des häufig verwendeten FITC (Fluoresceinisothiocyanat) kann die Nachweisempfindlichkeit bei Fluoreszenz-Immuno-Assays verbessert werden. Dies ist insbesondere bei der Bestimmung geringer Mengen von Antigenen in Körperflüssigkeiten, wie z.B. Plasma und Serum, von Vorteil. Beispiele für solche Antigene sind z.B. das carcinoembryonale Antigen (CEA), das β -HCG oder das α -Interferon.

Die im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendete Messapparatur für die zeitaufgelöste Fluoreszenzmessung wird im folgenden beschrieben und anhand eines Schemas erläutert.

Eine gepulste Lichtquelle - Farbstofflaser - regt mit Lichtblitzen geeigneter Wellenlänge, $\lambda = 463$ nm, die Messprobe zur Fluoreszenz an, wobei die Blitzdauer $t = 0,7$ ns viel kürzer als die Abklingzeit des fluoreszierenden Markers ist. Die Fluoreszenzstrahlung wird dann mit einer Optik durch einen Kantenfilter (Belzers 610), der die Emissionswellenlänge des Markers durchlässt, auf die Photokathode eines Photomultipliers geführt. Die einzelnen detektierten Photonen erzeugen Strompulse, die nach Verstärkung und Normierung digital gezählt werden (Photon-counting-Methode). Ueber eine Photodiode steuert das anregende Blitzlicht gleichzeitig eine Torschaltung, welche nach einer einstellbaren Verzögerungszeit $\delta = 2$ μ s den Zähler startet und nach einer einstellbaren Öffnungszeit des Messfensters $\Delta t = 3$ μ s den Zählprozess wieder stoppt. Die Verzögerungszeit Δ wird so gewählt, dass in ihr Streulichte sowie die Backgroundfluoreszenz praktisch vollständig abgedungen sind. Auf diese Art wird die Anzahl gezählter Pulse proportional zu der Markerfluoreszenzintensität, welche separat vom Background gemessen wird.


Schematische Darstellung der Messapparatur

65

60

65

8



- | | |
|--------------------|--|
| 1. Lichtquelle | 8. Verstärker |
| 2. Quarzplatte | 9. Diskriminator |
| 3. Probe | 10. Zähler |
| 4. Sammellinse | 11. Photodiode |
| 5. Kantenfilter | 12. Torschaltung |
| 6. Fokussierlinse | 13. Anregungs-Lichtblitz |
| 7. Photomultiplier | 14. Fluoreszenzlicht |
| | 15. Lichtblitz zur Steuerung
der Torschaltung (Trigger) |

Beispiel 1

Herstellung von Bathophenanthrolindsulfchlorid

2,2 g getrocknetes Bathophenanthrolindsulfonäure-Dinatriumsalz (Fluka) werden mit 3,1 g PCl_5 und 750 μl POCl_3 in einem 500 ml Rundkolben gut durchmischt. Der Kolben wird, versehen mit einem Rückflusskühler und einem Calciumchloridrohr, 2,5 Stunden lang in einem Ölbad auf 110°C erhitzt. Absublimiertes PCl_5 , das sich an den kühleren Stellen des Kolbens niedergeschlagen hat, wird zwischendurch abgekratzt. Anschliessend zieht man am Wasserstrahlvakuum bei 110°C das nicht umgesetzte PCl_5 sowie das POCl_3 innerhalb von 5 Stunden vollständig ab.

Nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur behandelt man das rohe Sulfchlorid zunächst kurz mit 150 ml Benzol, die verworfen werden (um Spuren von Verunreinigungen zu entfernen). Anschliessend wird es zweimal mit je 150 ml Chloroform extrahiert, wobei jeweils 1 Stunde bei Zimmertemperatur gerührt wird.

Die vereinigten Chloroformextrakteengt man am Vakuum ein. Das zurückbleibende Sulfchlorid wird dann 4 Stunden lang am Vakuum bei 110°C getrocknet (Ausbeute: 1,8 g).

Herstellung von Sulfonamidderivaten des Bathophenanthrolins mit dem t-Butylester des β -Alanins

$[(\text{SO}_2\text{-NH-CH}_2\text{CH}_2\text{-COO-t-butyl})_2\text{batho}]$ und $[(\text{SO}_2\text{Na})(\text{SO}_2\text{-NH-CH}_2\text{CH}_2\text{-COO-t-butyl})\text{batho}]$
 1,32 g β -Alanin-t-butylester und 10,5 ml Triäthylamin werden in 50 ml Chloroform aufgelöst. Zu dieser Lösung gibt man unter starkem Rühren innerhalb von 10 Minuten 2,0 g festes Bathophenanthrolindsulfchlorid. Nach 5-stündigem Rühren bei Zimmertemperatur lässt man das Reaktionsgemisch 4 Tage lang im Dunkeln stehen. Anschliessend zieht man bei $40-50^\circ\text{C}$ am Vakuum das Lösemittel sowie das Triäthylamin ab. Zur vollständigen Entfernung des Triäthylamins versetzt man den Rückstand mit 200 ml Chloroform und zieht dieses am Vakuum wieder ab. Dieses Verfahren wird insgesamt fünfmal durchgeführt, bis das Produkt keinen Geruch mehr nach Triäthylamin aufweist.

Die Reinigung des Rückstandes erfolgt durch Chromatographie über SiO_2 . Sie führt zu 2 Produkten.

a) Isolation des Disulfonamids

$[(\text{SO}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{COO-t-butyl})_2\text{batho}]$

Mit 8 l Aceton eluiert man dabei zunächst das praktisch reine Disulfonamid. Ausbeute: 900 mg.

b) Isolation des Monosulfonamids

$[(\text{SO}_2\text{Na})(\text{SO}_2\text{NH-CH}_2\text{CH}_2\text{-COO-t-butyl})\text{batho}]$

Mit 3 l eines Gemisches aus Chloroform/Methanol/Wasser (7/3/0,5) eluiert man eine weitere Zone, die aufgrund ihrer Fluoreszenzeigenschaften ein Phenanthroinderivat sein muss. Nach NMR handelt es sich dabei um das Monosulfonamid der Bathophenanthrolin-disulfonsäure, das wahrscheinlich durch teilweise Hydrolyse des Bathophenanthrolin-disulfonchlorids bei der Reaktion hat entstehen können (Ausbeute: 1,2 g Rohprodukt).

Zur weiteren Reinigung löst man das Rohprodukt in 150 ml Chloroform und schüttelt diese Lösung insgesamt dreimal mit je 100 ml Wasser aus. Anschliessend wird das Monosulfonamid noch zweimal umgefällt. Hierzu löst man die Verbindung in 50 ml Methanol/Chloroform (3/1) und fällt sie wieder durch langsames Zutropfen von 200 ml Äther aus. Ausbeute: 380 mg.

Herstellung des Ru-Komplexes [RC-1]

$\text{Ru}[(\text{SO}_2\text{Na})(\text{SO}_2\text{NH-CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]_2(\text{PF}_6)_2$

18,7 mg Kaliumpentachloroäquatethenat ($\text{K}_2\text{RuCl}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$) werden bei 60° in 2 ml Wasser aufgelöst, dem vorher noch 1 Tropfen 6N HCl zugesetzt worden war. Zu dieser Lösung gab man die 9-fache stöchiometrische Menge an Ligand (85,8 mg tert-Butylester gemäss b) gelöst in 1 ml DMF) und erhitze das Gemisch 2,5 Stunden lang unter N_2 am Rückfluss.

Nach dem Abkühlen der Reaktionslösung wird der entstandene Ru^{3+} -Komplex mit 250 μl einer 1 molaren NaH_2PO_4 -Lösung zum entsprechenden Ru^{2+} -Komplex reduziert und dann nochmals für 2 Stunden am Rückfluss gekocht.

Anschliessend filtrierte man die Lösung, versetzte sie mit 900 μl einer 10%igen wässrigen Ammoniumhexafluorophosphatlösung und lässt sie über Nacht bei 4°C stehen. Dabei fällt der Komplex aus.

Nach dem Abnutschen wird er mittels präparativer Dickschichtchromatographie (4 Kieselgel-Platten, Laufmittel $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{MeOH}/\text{H}_2\text{O}$ (7:3:0,5)) gereinigt.

Eine vordere rote Zone wird isoliert (50 mg reines Produkt) und zur Verseifung mit 5 ml Trifluoressigsäure bei Zimmertemperatur versetzt. Nach 1 Stunde wurde die Trifluoressigsäure am Wasserstrahlvakuum abgezogen.

Beispiel 2

Herstellung von $\text{Ru}[(\text{SO}_2\text{Na})\text{batho}]_2\text{Cl}_2$

627 mg $\text{RuCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, 568 mg LiCl und 3,26 g Bathophenanthrolin-disulfonsäure-dNa-Salz (Fluka) werden in 8 ml DMF 6 Stunden lang am Rückfluss gekocht. Nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur versetzt man die Reaktionslösung langsam mit 60 ml Aceton und lässt sie dann 20 Stunden lang bei 4°C stehen. Dabei fällt das violette Rohprodukt aus. Dieses wird abgenutscht und gut mit Aceton gewaschen. Eine erste Reinigung erfolgt dann durch Umfällen. Hierzu löst man das Rohprodukt in 50 ml Methanol und fällt es anschliessend wieder mit 500 ml

Aceton/Äther (1/1) aus. Dieses Verfahren wird wiederholt. Die weitere Reinigung erfolgt durch Chromatographie über SiO_2 . Mit 5 l Chloroform/Methanol/Aceton (4/3/3) eluiert man 600 mg praktisch reines Produkt (Ausbeute: 600 mg).

Herstellung des gemischten Komplexes $\text{Ru}[(\text{SO}_2\text{Na})\text{batho}]_2[(\text{SO}_2\text{NH-CH}_2\text{CH}_2\text{COO-t-butyl})\text{batho}]\text{Cl}_2$

78,2 mg $\text{Ru}[(\text{SO}_2\text{Na})\text{batho}]_2\text{Cl}_2$ werden in einem Gemisch aus 1 ml Wasser und 4 ml Methanol gelöst und mit 41,0 mg $[(\text{SO}_2\text{NH-CH}_2\text{CH}_2\text{COO-t-butyl})\text{batho}]$ (vgl. Beispiel 1a) (gelöst in 3 ml Chloroform) vermischt. Dieses Reaktionsgemisch wird 3 Stunden lang unter N_2 am Rückfluss erhitzt, wobei eine orange-rote Lösung entsteht. Anschliessend wird das Lösemittel durch Einblasen von N_2 und leichtem Erwärmen zu etwa 90% abdestilliert. Beim Abkühlen auf Zimmertemperatur fällt ein Teil des Produktes aus. Zur Reinigung löst man das Produkt in 1,5 ml Methanol und 0,5 ml DMF und chromatographiert es über SiO_2 mit dem Laufmittel Chloroform/Methanol/Wasser (7/3/0,5) (Ausbeute: 75 mg).

Herstellung des Ru-Komplexes [RC-2] $\text{Ru}[(\text{SO}_2\text{Na})\text{batho}]_2[(\text{SO}_2\text{NH-CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]\text{Cl}_2$

Verseifung des t-Butylesters. Hierzu werden 55 mg $\text{Ru}[(\text{SO}_2\text{Na})\text{batho}]_2[(\text{SO}_2\text{NH-CH}_2\text{CH}_2\text{COO-t-butyl})\text{batho}]\text{Cl}_2$ in 5 ml Trifluoressigsäure gelöst. Das Reaktionsgemisch lässt man 1 Stunde bei Zimmertemperatur stehen und zieht dann am Wasserstrahlvakuum bei 40°C die Trifluoressigsäure ab.

Das Rohprodukt wurde zunächst durch Säulenchromatographie über SiO_2 gereinigt. Laufmittel:

300 ml Chloroform/Aceton/Methanol (4/3/3)

500 ml Chloroform/Methanol/Wasser (50/50/2)

500 ml Chloroform/Methanol/Wasser (50/50/5)

250 ml Chloroform/Methanol/Wasser (50/50/10)

100 ml Methanol/Wasser (10/1)

100 ml Methanol/Wasser (1/1)

Die endgültige Reinigung erfolgt mittels präparativer Dickschichtchromatographie. 40 mg des Ru-Komplexes werden hierzu in 700 μl Wasser gelöst und auf 4 PSC-Platten (SiO_2 -Platten von Merck) aufgetragen. Über Nacht werden diese bei 60°C getrocknet und anschliessend mit dem Laufmittel Chloroform/Methanol/Wasser (50/50/2) chromatographiert. Die Hauptzone wird herauskratzt und dreimal mit je 40 ml Wasser extrahiert (das Kieselgel wird dabei durch Zentrifugation abgetrennt). Nach dem Einengen werden vom Produkt noch letzte Spuren SiO_2 entfernt, indem man es in wenig Methanol löst und das ungelöste Kieselgel abzentrifugiert (Ausbeute: 38 mg).

Beispiel 3

Herstellung des Bathophenanthrolindsulfonamids mit dem t-Butylester des Glycins [(SO,NH CH₂ COO-t-butyl), batho]

Diese Sulfonamidsynthese erfolgte analog der in Beispiel 1 beschriebenen.

Ansatz: Glycin-t-butylester Dibenzotriimidazol (10,3 g), Triäthylamin (28 ml) und Bathophenanthrolindsulfochlorid (4,2 g).

Ausbeute: 4,9 g [(SO,NH CH₂COO-t-butyl), batho]

Herstellung des gemischten Komplexes Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NH CH₂ COO-t-butyl), batho]Cl₂

3,6 g Ru[(SO₂Na), batho]₂Cl₂ (siehe Beispiel 2) werden in einem Gemisch aus 180 ml Methanol und 100 ml Wasser gelöst und mit 2,01 g [(SO₂NH CH₂ COO-t-butyl), batho] (gelöst in 80 ml Methanol) vermischt.

Dieses Reaktionsgemisch wird 6 Stunden lang unter N₂ am Rückfluss gekocht, wobei eine tiefrote Lösung entsteht. Nach dem Abkühlen ergießt man die Reaktionslösung am Vakuum auf etwa 70 ml ein und fällt den gemischten Ru-Komplex dann durch langsames Zutropfen von 1,4 l Aceton aus.

Zur weiteren Reinigung wird das abgenutzte Rohprodukt zweimal umgefällt. Man löst hierzu den Niederschlag in etwa 150 ml MeOH/H₂O/CH₂Cl₂ (2:1:0,3) und fällt den Komplex dann wieder aus durch langsames Zutropfen von 1,5 l Aceton.

Zum Schluss wird das Produkt noch zweimal über Kieselgel chromatographiert mit dem Laufmittel CH₂Cl₂/MeOH/H₂O (7:3:0,5). Nach einer weiteren Umfällung analog oben erhält man ein reines Produkt. Ausbeute: 3,0 g rotes Pulver.

Verseifung des t-Butylesters zum label [RC-3] Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NH CH₂COOH), batho]Cl₂

500 mg Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NHCH₂COO-t-butyl), batho]Cl₂ werden in 40 ml Trifluoressigsäure dispergiert. Nach 2,5-stündigem Rühren bei RT wird die Trifluoressigsäure am Vakuum abgezogen. Den Rückstand löst man in einem Gemisch aus 1 ml DMF und 3 ml Wasser. Durch langsames Zutropfen von 500 ml Aceton/MeOH (8:2) fällt man das aus dem Komplex wieder aus.

Dieser Umfällprozess wird noch zweimal wiederholt, dann trocknet man das rote Pulver bei 70°C am Vakuum. Ausbeute: 420 mg.

Beispiel 4

Herstellung des Bathophenanthrolindsulfonamids mit dem t-Butylester der 4-Aminobuttersäure

[(SO₂NHCH₂CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]

Diese Sulfonamidsynthese erfolgte analog der in Beispiel 1 beschriebenen.

Ansatz: 4-Aminobuttersäure-t-butylester (1,57 g) Triäthylamin (17 ml) und Bathophenanthrolindsulfochlorid (2,1 g). Ausbeute: 1,3 g [(SO₂NH CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]

Herstellung des gemischten Komplexes

Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NH CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]Cl₂ CH₂C

Diese Synthese erfolgte analog der Vorschrift von Beispiel 3.

Ansatz: 1,28 g Ru[(SO₂Na), batho]₂Cl₂ und 0,775 g [(SO₂NH CH₂CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]. Ausbeute: 1,85 g rotes Pulver.

Verseifung des t-Butylesters zum label [RC-4]

Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NH CH₂CH₂CH₂COOH), batho]Cl₂

Ansatz: Verseifung von 70 mg t-Butylester-Derivat Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NH CH₂CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]Cl₂ analog der Vorschrift von Beispiel 3. Ausbeute: 50 mg.

Beispiel 5

Herstellung des Bathophenanthrolindsulfonamids mit dem t-Butylester der 6-Aminocaproensäure

[(SO₂NH CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]

Diese Sulfonamidsynthese erfolgte analog der in Beispiel 1 beschriebenen.

Ansatz: 6-Aminocaproensäure-t-butylester (2,27 g) Triäthylamin (17 ml) und Bathophenanthrolindsulfochlorid (2,1 g). Ausbeute: 1,8 g [(SO₂NH CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COO-t-butyl), batho].

Herstellung des gemischten Komplexes

Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NH CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]Cl₂

Diese Synthese erfolgte analog der Vorschrift von Beispiel 3.

Ansatz: 2,3 g Ru[(SO₂Na), batho]₂Cl₂ und 1,49 g [(SO₂NH CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]. Ausbeute: 2,8 g rotes Pulver.

Verseifung des t-Butylesters zum label [RC-5]

Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NH CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COOH), batho]Cl₂

Ansatz: Verseifung von 100 mg t-Butylester-Derivat Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂NH CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COO-t-butyl), batho]Cl₂ analog der Vorschrift von Beispiel 3. Ausbeute: 85 mg.

Beispiel 6

Herstellung des gemischten Komplexes

Ru[(SO₂Na), batho], [(SO₂Na)(SO₂NH CH₂COO-t-butyl), batho]Cl₂ CH₂C

Diese Synthese erfolgte analog der Vorschrift von Beispiel 3.

Ansatz: 102 mg Ru[(SO₂Na), batho]₂Cl₂ und 51 mg [(SO₂Na)(SO₂NH CH₂CH₂COO-t-butyl), batho] (siehe Beispiel 1). Ausbeute: 105 mg rotes Pulver.

Verseifung des t-Butylesters zum Label [RC-6]

Ansatz: Verseifung von 105 mg t-Butylester-Derivat $\text{Ru}(\text{SO}_3\text{Na})_2(\text{batho})_2, [(\text{SO}_3\text{Na})(\text{SO}_3\text{NH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO-tbutyl}(\text{batho})]\text{Cl}_2$ analog der Vorschrift von Beispiel 3. Reinigung erfolgt durch präparative Dickschichtchromatographie (Kieselgel-Platten, Laufmittel $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}/\text{Aceton}$ (4:3:3)). Ausbeute: 32 mg.

Beispiel 7

Synthese von
-[8-Chloropropionyl-5-phenyl-valeriansäuremethylester]

In einem Rührkolben mit Rückflusskühler werden 9,3 g AlCl_3 , 10 ml CS_2 und 1,88 ml β -Chlorpropionylchlorid vorgelegt. Zu diesem Gemisch lässt man bei Zimmertemperatur innert 5 Minuten 3,61 g 5-Phenylvaleriansäure zutropfen (nachgespült wird mit 2 ml CS_2). Das Reaktionsgemisch wird anschliessend noch 15 Minuten weiter gerührt, leicht erwärmt und dann abgekühlt.

Dann pipettiert man das Reaktionsgemisch in eine gerührte Mischung von Eis, Wasser und Äther. Die organische Phase wäscht man mit Bicarbonatlösung und Wasser neutral. Nach dem Trocknen über MgSO_4 zieht man das Lösungsmittel ab. Dabei erhält man 5,03 g kristallines Produkt.

Synthese von
5-[p-(7-Phenyl-1,10-phenanthrolin-4-yl)phenyl]-pentensäure



In einem Rührkolben werden unter Argon 2,54 g 4-Phenyl-8-aminochinolin, 11,6 ml H_3PO_4 (85%ig) und 2,3 ml Arsensäurelösung (80%ige H_3AsO_4) vorgelegt. Zum Lösen des Chinolins erhitzt man das Gemisch auf 120°C . Dann fügt man innerhalb von 5 Minuten noch 4,56 g p-[β -Chlorpropionyl]-5-phenylvaleriansäuremethylester hinzu. Anschliessend heizt man das Reaktionsgemisch unter Rühren innerhalb von 10 Minuten auf 140°C auf und lässt es auf dieser Temperatur noch 1 Stunde.

Zur Aufarbeitung kühlt man das Reaktionsgemisch ab und pipettiert es in ein gerührtes Gemisch von 50 ml Wasser und 125 ml CH_2Cl_2 , das gut mit Eis gekühlt wird. Durch Zufügen von Natronlauge bringt man den pH-Wert auf 8. Dabei geht die Substanz in die organische Phase über.

Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels erhält man ein Rohprodukt, das neben dem Methylester auch noch freie Säure enthält (die Reaktionsbedingungen wirken hydrolytisch). Durch Behandlung mit Diazomethan (in Äther/Methanol) wird das Gemisch wieder vollständig in den Methylester überführt.

Nach zweimaliger Chromatographie mit Essigester an Alox III (mit 1,5% H_2O noch zusätzlich desaktiviert) erhält man 3,022 g Methylester.

Zur Verseifung löst man diesen in 20 ml Äthanol auf, versetzt die Lösung mit Natronlauge (0,950 g NaOH gelöst in 5 ml H_2O) und erhitzt sie unter Argon für 2 Stunden auf 80°C . Die abgekühlte Lösung wird in ein $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{H}_2\text{O}$ Gemisch gegeben, dann der pH-Wert der Lösung mit 85%iger H_3PO_4 auf 4-5 eingestellt und anschliessend das Produkt extrahiert.

Das eingeengte CH_2Cl_2 -Extrakt wird aus Benzol umkristallisiert, dabei erhält man 1,35 g Produkt. Aus der eingeengten Mutterlauge erhält man durch Umkristallisieren aus Äthanol noch weitere 0,338 g Produkt.

Gesamtausbeute 1,688 g Säure (kristallisiert ohne Lösungsmittel), Fpkt. $234-235^\circ\text{C}$.

Herstellung des Ru-Komplexes [RC-7]

Zu einer Lösung von 102,4 mg $\text{Ru}(\text{SO}_3\text{Na})_2(\text{batho})_2, \text{Cl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ in 4 ml Methanol und 8 ml Wasser gibt man 34,6 mg 5-[p-(7-Phenyl-1,10-phenanthrolin-4-yl)phenyl]-pentensäure aufgelöst in 2 ml Methanol. Dieses Gemisch wird 3 Stunden lang unter N_2 am Rückfluss erhitzt, wobei eine orange-rote Lösung entsteht.

Anschliessend entfernt man den grössten Teil des Lösungsmittels durch Einblasen von N_2 . Der Rest wird dann vollends mit dem Rotationsverdampfer abgezogen.

Die Reinigung des Rohproduktes erfolgt mittels präparativer Dickschichtchromatographie. Der Komplex wird hierzu in wenig Wasser aufgelöst und auf 6 PSC-Platten (SiO_2 -Platten von Merck) aufgetragen. Nach dem Trocknen der Platten bei 70° chromatographiert man mit dem Laufmittel Chloroform/Aceton/Methanol (4/3/3).

Das mit Wasser extrahierte Hauptzonenprodukt wurde noch dreimal einer präparativen Dickschichtchromatographie unterworfen, wobei folgende Laufmittel verwendet wurden: Aceton/Wasser (9/1), dann Aceton/Wasser (8,5/1,5) und schliesslich Chloroform/Methanol/Wasser (50/50/2).

Zur Entfernung von letzten Spuren SiO_2 löst man das extrahierte Produkt in wenig Methanol und zentrifugiert das ungelöste Kieselgel ab. Aus 1 ml methanolischer Lösung wurde dann das Produkt mit 50 ml Aceton ausgefällt. Ausbeute: 42,6 mg (rotes Pulver).

Beispiel 8

Synthese von
-[8-Chloropropionyl-8-phenyl-capronsäuremethylester]

In einem Rührkolben mit Rückflusskühler werden 17,2 g AlCl_3 , 18,5 ml CS_2 und 3,6 ml β -Chlorpropionylchlorid vorgelegt. Zu diesem Gemisch lässt man bei Zimmertemperatur innert 10 Minuten 7,06 g 8-Phenylcapronsäuremethylester zutropfen (nachgespült wird mit 4 ml CS_2). Das Reaktionsgemisch wird anschliessend noch 15 Minuten weiter gerührt, leicht erwärmt und dann abgekühlt.

Dann pipettiert man das Reaktionsgemisch in eine gerührte Mischung von Eis, Wasser und Äther. Die organische Phase wäscht man mit Bicarbonatlösung und Wasser neutral. Nach dem Trocknen über MgSO_4 zieht man das Lösungsmittel ab. Dabei erhält man 10,2 g kristallines Produkt.

Synthese von
10-(7-Phenyl-1,10-phenanthrolin-4-yl)-phenyl-hexensäure



In einem Rührkolben werden unter Argon 5,90 g 4-Phenyl-8-aminochinolin, 27 ml H_3PO_4 (85%ig) und 5,35 ml Arsensäurelösung (80%ige H_3AsO_4) vorgelegt. Zum Lösen des Chinolins erhitzt man das Gemisch auf 120°C .

Dann fgt man innerhalb von 5 Minuten noch 11,15 g p-[β -Chlorpropionyl]-6-phenylcapronsuremethylester hinzu. Anschliessend erhitzt man das Reaktionsgemisch unter Rhren innerhalb von 10 Minuten auf 140°C und lsst es auf dieser Temperatur noch 1 Stunde.

Zur Aufarbeitung khlt man das Reaktionsgemisch ab und pipettiert es in ein gerhrtes Gemisch von 100 ml Wasser und 250 ml CH_2Cl_2 , das gut mit Eis gekhlt wird. Durch Zufgen von Natronlauge (etwa 2/3 einer Lsung aus 45 g NaOH in 200 ml Wasser) bringt man dann den pH-Wert auf 5. Dabei geht die Substanz in die organische Phase ber.

Nach dem Abdampfen des Lsemittels erhlt man 15,78 g dickflssiges Oil, das neben dem Methylester auch noch freie Sure enthlt (die Reaktionsbedingungen wirken hydrolysierend). Durch Behandlung mit Diazomethan (in Aether/Methanol) wird das Gemisch wieder vllstndig in den Methylester berfhrt. Dieser wird mit Essigester an 350 g Alcoa III (mit 1% H_2O noch zustzlich desaktiviert) chromatographiert (Fraktionen  120 ml). Reines Produkt enthalten die Fraktionen 5 bis 9.

Die Fraktionen 3, 4 und 10 sind dagegen noch verunreinigt. Sie werden nochmals mit Essigester ber Aluminiumoxid chromatographiert (wie vorher beschrieben). Aus den reinen Fraktionen der beiden Chromatographien erhlt man nach dem Abziehen des Lsemittels 6,979 g Methylester.

Zur Verseifung lst man den Ester in 45 ml Aethanol auf, versetzt diese Lsung mit Natronlauge (2,24 g NaOH gelst in 11 ml H_2O) und erhitzt sie unter Argon fr 2 Stunden auf 80°C. Dann zieht man am Rotationsverdampfer das Aethanol ab und nimmt den Rckstand in einem Gemisch von CH_2Cl_2 /Wasser auf. Mit 3,75 ml H_3PO_4 85%ig wird der pH-Wert auf ca. 3 eingestellt und dann das Produkt extrahiert.

Das Extrakt wird neutral gewaschen, getrocknet und bis auf 300 ml eingedunstet. Nach dem Zusatz von insgesamt 3,5 g Norit SX-3 rhrt man die Lsung 40 Minuten lang, filtriert sie und engt sie bis auf wenig CH_2Cl_2 ein. Nun gibt man 20 ml Benzol hinzu und lsst die Substanz whrend 48 Stunden bei Zimmertemperatur auskristallisieren.

Durch Abnutschen, Waschen mit Benzol und Trocknen im Exsikkator erhlt man 5,393 g Produkt, das im Kristall noch Benzol enthlt.

Das Benzol-freie Produkt hat einen Fpkt. von 185°.

Herstellung des Ru-Komplexes [RC-8]

$\text{Ru}(\text{SO}_3\text{Na})_2\text{batho}]_2[(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]_2\text{Cl}_2$

Zu einer Lsung von 384 mg $\text{Ru}(\text{SO}_3\text{Na})_2\text{batho}]_2\text{Cl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ in 20 ml Methanol und 5 ml Wasser gibt man 134,2 mg 6-[p-(7-Phenyl-1,10-phenanthrolin-4-yl)phenyl]-hexansure aufgelst in 5,7 ml Methanol. Dieses Gemisch wird 3 Stunden lang unter N_2 am Rckfluss erhitzt, wobei eine orange-rote Lsung entsteht.

Anschliessend entfernt man den grssten Teil des Lsemittels durch Einblasen von N_2 . Der Rest wird dann vollends mit dem Rotationsverdampfer abgezogen.

Die Reinigung des Produktes erfolgt zunchst durch zweifache Sulenchromatographie ber SiO_2 mit dem Laufmittel Chloroform/Methanol/Wasser (7/3/0,5). Anschliessend wird der Komplex noch mittels prparativer Dickschichtchromatographie gereinigt (SiO_2 -Platten von Merck). Laufmittel: Chloroform/Methanol/Wasser (7/3/0,5).

Die Hauptzone wird nach dem Herauskratzen mit Methanol extrahiert. Ausbeute: 162 mg (rotes Pulver).

Beispiel 9

6 Herstellung der Benzobathooctenanthrolyl-pentansure

$[(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]$

Die Synthese dieser Verbindung erfolgte aus 2-Amino-3-naphthoesure mittels Skraup'scher Reaktion analog dem in Beispiel 7 angegebenen Verfahren fr $[(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]$. Gesamtausbeute: 1,07 g.

Herstellung des Ru-Komplexes [RC-9]

$\text{Ru}(\text{SO}_3\text{Na})_2\text{batho}]_2[(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]_2\text{Cl}_2$

Diese Synthese erfolgte analog der Vorschrift von Beispiel 3.

Ansatz: 1,28 g $\text{Ru}(\text{SO}_3\text{Na})_2\text{batho}]_2\text{Cl}_2$ und 0,561 g $[(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})\text{batho}]$. Ausbeute: 1,1 g rotes Pulver.

Beispiel 10

Herstellung des Ru-Komplexes [RC-10]

$\text{Ru}(\text{SO}_3\text{Na})_2\text{batho}]_2[(\text{COOH})_2\text{bpy}]_2\text{Cl}_2$

Diese Synthese erfolgte analog der Vorschrift von Beispiel 3.

Ansatz: 256 mg $\text{Ru}(\text{SO}_3\text{Na})_2\text{batho}]_2\text{Cl}_2$ 49 mg 4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridin und 60 mg NaHCO_3 (zum Solubilisieren des Bipyridins) in 25 ml $\text{MeOH/H}_2\text{O}$ (1:2). Ausbeute: 290 mg rotes Pulver.

Beispiel 11

Markierung von anti-CEA mit dem Ru-Komplex [RC-2]

Die Kopplung des gemischten Ru-Komplexes [RC-2] an anti-CEA erfolgte mit Hilfe des wasserlslichen Carbodiimid-Derivates N-Cyclohexyl-N'-(2-morpholinothyl)-carbodiimid-methyl-p-toluolsulfonat. Da der Komplex ber zwei reaktive Gruppen pro Molekl verfgt, wird molar die doppelte Menge an Carbodiimid verwendet.

Fr die Kopplungsreaktion stellt man die folgenden Stammlsungen her:

1) 4,00 mg/ml Ru-Komplex [RC-2] in Wasser bei pH 4,5

2) 2,17 mg/ml anti-CEA vom Kaninchen (DAKO Code Nr. A 115, Lot 112 B) in 200 mM NaHCO_3 ; pH 8,5.

136 μl Stammlsung 1 werden mit 264 μl Wasser pH 4,5 (eingestellt mit HCl) verdnnt. Dazu gibt man 0,27 mg N-Cyclohexyl-N'-(2-morpholinothyl)-carbodiimid-methyl-p-toluolsulfonat und durchmischt kurz am Vortex. Nach 2 Minuten fgt man 400 μl von der anti-CEA Stammlsung 2 hinzu und durchmischt wieder gut am Vortex. Durch die Zugabe von wenig 1N HCl wird der pH-Wert auf 8,5 eingestellt. Dann lsst man das Reaktionsgemisch 17 Stunden lang bei Zimmertemperatur im Dunkeln stehen.

Zur Abtrennung des markierten anti-CEAs wurden 500 µl des Reaktionsgemisches über eine Säule (Länge 30 cm, Durchmesser 9 mm) mit Acrylamid Gel ACA-64 von LKB chromatographiert (Laufmittel: 150 mM NaCl, 10 mM Natriumphosphat, 0,02% NaN₃, pH 7,0). Die Fraktionen mit dem höchsten Gehalt an markiertem anti-CEA wurden vereinigt - insgesamt 5,2 ml. In dieser Lösung wurde der Gehalt an anti-CEA und an Ru-Komplex UV-spektroskopisch bestimmt (aus der optischen Dichte bei 278 nm - Absorption von anti-CEA und Ru-Komplex, sowie aus der optischen Dichte bei 445 nm - Absorption des Ru-Komplexes allein). Es wurden dabei folgende Konzentrationen erhalten:

0,66 x 10⁻⁶ M/l Ru-Komplex

0,58 x 10⁻⁶ M/l anti-CEA.

Dies entspricht einem Markierungsgrad von 1,1.

Beispiel 12

Durchführung eines Fluoreszenzimmunoassays mit CEA Standards

Zur quantitativen Bestimmung von CEA-Standards wird ein Sandwichtest mit einem monoklonalen CEA-Antikörper und einem polyklonalen CEA-Antikörper (markierte Antikörper von DAKO) wie folgt durchgeführt:

a) In die erforderliche Anzahl Teströhrchen (10 x 75 mm) werden je 0,250 ml CEA-Standardlösung (0 ng/ml CEA; 2,5 ng/ml CEA; 5 ng/ml CEA; 10 ng/ml CEA; 20 ng/ml CEA in 150 mM NaCl, 10 mM Na-Phosphat mit 20 g/l Rinderserumalbumin) pipettiert, je eine mit monoklonalem anti-CEA sensibilisierte Polystyrolkugel (Durchmesser 6,5 mm) zugefügt und bei 37°C während 24 Stunden inkubiert. Anschliessend werden die Polystyrolkugeln dreimal mit je 2-5 ml destilliertem Wasser gewaschen und dann in Teströhrchen transferiert, die je 0,250 ml Pufferlösung mit 1 x 10⁻⁸ M/l markiertem Kaninchen anti-CEA enthalten (Markierungsgrad 1,1).

Nach einer 24-stündigen Inkubation bei 37°C werden die Kugeln wieder dreimal mit je 2-5 ml destilliertem Wasser gewaschen und anschliessend in Teströhrchen mit je 2 ml Schwefelsäure (0,09N) transferiert. Nach 30 Minuten

pipetiert man die Schwefelsäure-Lösung in Messküvetten und misst den Gehalt an Ru-Komplex fluoreszenzspektroskopisch (Anregungswellenlänge 453 nm, Emissionswellenlänge 612 nm).

Die Messung erfolgte mit der früher beschriebenen Apparatur unter Verwendung eines Kantentfilters B 610 von Balzers, einer zeitlichen Verzögerung der Fluoreszenzmessung von 2 µsec (bezogen auf den Anregungsputz) und einer Öffnung des Messtansters von 3 µsec.

In der Tabelle I sind die Werte einer CEA-Bestimmung aufgeführt, die mit einer Reihe von CEA-Standards von Roche erhalten wurden.

Die Empfindlichkeit bei diesem zweistufigen Test beträgt 60 pg/ml CEA.

Der CEA Test konnte auch in einem Eintopfverfahren gemäss folgendem Verfahren durchgeführt werden.

b) In die erforderliche Anzahl Teströhrchen (10 x 75 mm) gibt man je 0,125 ml CEA-Standardlösung (0 ng/ml CEA; 2,5 ng/ml CEA; 5 ng/ml CEA; 10 ng/ml CEA; 20 ng/ml CEA in totalem Kälberserum) sowie je 0,125 ml Lösung mit 2 x 10⁻⁸ M/l Kaninchen anti-CEA, das mit dem Ru-Komplex markiert ist (Markierungsgrad 1,25; Verdünnungspuffer pH 7,1 enthält 0,1 M/l Tris, 20% totales Kälberserum, 0,05% Timersol und 0,02% Tween 20). Dann fügt man noch je eine Polystyrolkugel (Durchmesser 6,5 mm sensibilisiert mit monoklonalem anti-CEA) hinzu und inkubiert bei 37°C während 24 Stunden.

Anschliessend werden die Kugeln dreimal mit je 2-5 ml destilliertem Wasser gewaschen und dann in Teströhrchen mit je 2 ml Schwefelsäure (0,09N) transferiert. Nach 30 Minuten pipettiert man die Schwefelsäure-Lösung in Messküvetten und misst den Gehalt an Ru-Komplex fluoreszenzspektroskopisch (die Messbedingungen sind identisch mit jenen von Teil a)).

Die Resultate dieser CEA-Bestimmung sind in Tabelle II zusammengestellt. Bei den Eintopfverfahren findet man eine Empfindlichkeit von 430 pg/ml CEA.

Tabelle I

Fluoreszenzspektroskopische Bestimmung von CEA-Standards (zweistufiges Verfahren)

Konzentration an CEA (Roche Standard Lösungen)	Rel. Fluoreszenzintensität
0 ng/ml CEA	0,071
2,5 ng/ml CEA	0,532
5 ng/ml CEA	1,041
10 ng/ml CEA	1,846
20 ng/ml CEA	4,121

Tabelle II

Fluoreszenzspektroskopische Bestimmung von CEA-Standards (Eintopf-Verfahren)

65

14

Konzentration an CEA R 1. Fluoreszenzintensität
(Roche Standard Lösungen)

0	ng/ml CEA	0,27
2,5	ng/ml CEA	1,21
5	ng/ml CEA	2,66
10	ng/ml CEA	5,13
20	ng/ml CEA	9,74

Beispiel 13

Markierung von anti-HCG

Die Markierung von anti-HCG mit dem Ru-Komplex [RC-2] erfolgte auf gleiche Art und Weise wie jene von anti-CEA gemäss Beispiel 11.

Für die Kopplungsreaktion stellt man die folgenden Stammlösungen her:

1) 4,00 mg/ml Ru-Komplex [RC-2] in Wasser bei pH 4,5

2) 10,83 mg/ml anti-HCG vom Kaninchen (DAKO Code Nr. A 231 Lot 032 A) in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

150 µl Stammlösung 1 werden mit 250 µl Wasser pH 4,5 (eingestellt mit HCl) verdünnt. Zu dieser Lösung gibt man

0,30 mg N-Cyclohexyl-N'-(2-morpholinoäthyl)-carbodiimid -methyl -p-toluolsulfonat und durchmischt kurz am Vortex. Nach 2 Minuten fügt man die anti-HCG-Lösung (222 µl Stammlösung 2 verdünnt mit 178 µl einer 200 mM NaHCO₃-Lösung pH 8,5) hinzu und durchmischt gut am Vortex. Mit wenig HCl wird der pH-Wert auf 8,5 eingestellt. Dann lässt man das Reaktionsgemisch 17 Stunden lang bei Zimmertemperatur im Dunkeln stehen.

Zur Abtrennung des markierten anti-HCGs werden 500 µl des Reaktionsgemisches über eine Säule (Länge 30 cm, Durchmesser 9 mm) mit Acrylamid Gel Aca-54 (von LKB) chromatographiert (Laufmittel: 150 mM NaCl, 10 mM Na-Phosphat, 0,02% NaN₃, pH 7,0). Die Fraktionen mit dem höchsten Gehalt an markiertem anti-HCG werden vereinigt - insgesamt 5,2 ml. In dieser Lösung wird der Gehalt an anti-HCG und an Ru-Komplex UV-spektroskopisch bestimmt. Es werden dabei folgende Konzentrationen erhalten:

$2,01 \times 10^{-6}$ M Ru-Komplex

$2,04 \times 10^{-6}$ M anti-HCG

Dies entspricht einem Markierungsgrad von 1,0.

Beispiel 14

Durchführung eines Fluoreszenzimmoassays mit β -HCG Standards

Zur quantitativen Bestimmung von β -HCG-Standards wird ein Sandwichtest mit einem monoklonalen β -HCG-Antikörper und einem polyklonalen HCG-Antikörper (markierte Antikörper von DAKO) wie folgt durchgeführt:

In die erforderliche Anzahl Teströhrchen (10 x 75 mm) gibt man je 0,050 ml β -HCG-Standardlösung (0 mIU/ml; 10 mIU/ml; 25 mIU/ml; 50 mIU/ml; 100 mIU/ml; 200 mIU/ml), 0,050 ml Lösung mit $5,12 \times 10^{-8}$ M/1 anti-HCG, das mit dem Ru-Komplex markiert ist (Markierungsgrad 1,0; Verdünnungspuffer pH 7,1 enthält 0,1 M Tris, 20% fötales Kälberserum, 0,05% Thimerosal und 0,02% Tween 20) sowie je 0,150 ml Pufferlösung (150 mM NaCl, 10 mM Na-Phosphat mit 20 g/l Rinderserumalbumin). Dann fügt man noch je eine Polystyrolkugel (Durchmesser 6,5 mm sensibilisiert mit monoklonalem anti- β -HCG) hinzu und inkubiert bei 37°C während 18 Stunden.

Anschliessend werden die Kugeln dreimal mit je 2-5 ml destilliertem Wasser gewaschen und dann in Teströhrchen mit je 2 ml Schwefelsäure (0,09N) transferiert. Nach 30 Minuten pipettiert man die Schwefelsäure-Lösung in Messküvetten und misst den Gehalt an Ru-Komplex fluoreszenzspektroskopisch (die Messbedingungen sind identisch mit jenen von Beispiel 12).

Die Resultate dieser β -HCG-Bestimmung sind in der Tabelle III zusammengestellt. Bei diesem Eintopfverfahren findet man eine Empfindlichkeit von 2,2 mIU/ml β -HCG.

Tabelle III

Fluoreszenzspektroskopische Bestimmung von β -HCG-Standards (Eintopf-Verfahren)

Konzentration an β -HCG (Roche Standard Lösungen)	Rel. Fluoreszenzintensität
0 mIU/ml	0,44
10 mIU/ml	0,34
25 mIU/ml	0,80
50 mIU/ml	1,56
100 mIU/ml	2,78
200 mIU/ml	5,81

Beispiel 15

Markierung von anti- α -Interferon

Die Markierung von monoklonalem anti- α -Interferon (von Roche Diagnostica) mit dem Ru-Komplex [RC-2] erfolgte auf gleiche Art und Weise wie jene von anti-CEA gemäss Beispiel 11.

Für die Kopplungsreaktion stellt man die folgenden Stammlösungen her:

- 1) 3,75 mg Ru-Komplex [RC-2] in Wasser bei pH 4,5
- 2) 8,0 mg/ml monoklonales anti- α -Interferon in 200 mM NaHCO_3 ; pH 8,5.

Zu 400 μ l Stammlösung 1 gibt man 0,81 mg vom wasserlöslichen Carbodilimid-Derivat und durchmischt kurz am Vortex.

Nach 2 Minuten fügt man 400 μ l von der anti- α -Interferon-Stammlösung 2 hinzu und durchmischt wiederum kurz am Vortex. Dann lässt man das Reaktionsgemisch 17 Stunden lang bei Zimmertemperatur im Dunkeln stehen.

Zur Abtrennung des markierten anti- α -Interferons werden 500 μ l des Reaktionsgemisches über eine Säule (Länge 30 cm, Durchmesser 9 mm) mit Acrylamid-Gel Aca-84 von LKB chromatographiert (Lautmittel: 150 mM NaCl, 10 mM Na-Phosphat, 0,02% NaN_3 , pH 7,0).

Die Fraktion mit dem höchsten Gehalt an markiertem anti- α -Interferon werden vereinigt - insgesamt 5,2 ml. In dieser Lösung wird der Gehalt an anti- α -Interferon und an Ru-Komplex UV-spektroskopisch bestimmt.

Man erhält dabei folgende Konzentrationen:

- $11,5 \times 10^{-6}$ M/l Ru-Komplex
- $1,8 \times 10^{-6}$ M/l anti- α -Interferon (monoklonal).

Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 6,4.

Beispiel 16

20 Durchführung eines Fluoreszenzimmunoassays mit α -Interferon-Standards

Zur quantitativen Bestimmung von Interferon- α A Standards (recombinant leucocyte interferon) wird ein von Roche Diagnostica als EIA entwickelter Sandwichtest verwendet. Anstelle des Enzym-markierten zweiten Antikörpers benutzt man jedoch monoklonales anti-Interferon, das mit dem Ru-Komplex [RC-2] markiert ist (Markierungsgrad 6,4).

Die quantitative Bestimmung der verschiedenen Interferon- α A Standards erfolgte nach folgendem Verfahren (einstufiger Test):

In die erforderliche Anzahl Teströhrchen (10 x 75 mm) gibt man je 0,100 ml Interferon- α A Standard-Lösung (0 U/ml r IFN α A; 25 U/ml r IFN α A; 50 U/ml r IFN α A; 100 U/ml r IFN α A; 150 U/ml r IFN α A; 200 U/ml r IFN α A in Normal-Human-Serum mit Thimerosal) sowie je 0,500 ml Lösung mit $5,26 \times 10^{-10}$ M/l monoklonalem anti- α -Interferon, das mit dem Ru-Komplex [RC-2] markiert ist (Markierungsgrad 6,4; Puffersystem: 150 mM NaCl, 10 mM Na-Phosphat pH 7,5). Dann fügt man noch je eine Polystyrolkugel (Durchmesser 6,5 mm; sensibilisiert mit monoklonalem anti-Interferon) hinzu und inkubiert bei Zimmertemperatur (26°C) während 24 Stunden.

Anschließend werden die Kugeln dreimal mit je 2-5 ml destilliertem Wasser gewaschen und dann in Teströhrchen mit je 2 ml Schwefelsäure (0,09N) transferiert. Nach 30 Minuten pipettiert man die Schwefelsäure-Lösung in Messküvetten und misst den Gehalt an Ru-Komplex fluoreszenzspektroskopisch. (Die Messbedingungen sind identisch mit jenen von Beispiel 12).

Die Resultate der r IFN α A Bestimmungen sind in Tabelle IV zusammengestellt.

Im Bereich von 0-200 U/ml findet man annähernd eine lineare Beziehung zwischen der Fluoreszenzintensität und der r IFN α A-Konzentration. Die Empfindlichkeit beträgt 0,46 U/ml r IFN α A.

Tabelle IV

Fluoreszenzspektroskopische Bestimmung von r IFN α A Standards

Konzentration an r IFNaA (Roche Standard Lösungen)	Rel. Fluoreszenzintensität
0 U/ml	0,14
25 U/ml	0,51
50 U/ml	0,89
100 U/ml	1,80
150 U/ml	2,77
200 U/ml	4,01

Beispiel 17

20

0,43 x 10⁻⁶ M Ru-Komplex
0,84 x 10⁻⁶ M anti-CEA
Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 0,5.

Markierung von polyklonalem anti-HCG mit dem Ru-Komplex [RC-7]

25

Für die Kopplungsreaktion werden die folgenden Stammlösungen hergestellt:

1) 8,4 mg/ml Ru-Komplex [RC-7] in Wasser bei pH 4,5.

2) 6,0 mg/ml polyklonales anti-HCG vom Kaninchen (DAKO Code Nr. A 231, Lot 032A) in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

Die Kopplungsreaktion wird nach dem im Beispiel 11 beschriebenen Verfahren durchgeführt. Man verwendet hierzu jeweils 400 µl von den Stammlösungen 1 und 2 sowie 0,56 mg vom wasserlöslichen Carbodimid.

Die markierten Antikörper wurden - wie in Beispiel 11 beschrieben - durch Gelchromatographie vom Ueberschuss an Ru-Komplex [RC-7] abgetrennt.

Die UV-spektroskopische Bestimmung des Gehaltes an anti-HCG und an Ru-Komplex ergab folgende Werte:

3,81 x 10⁻⁶ M Ru-Komplex

1,87 x 10⁻⁶ M anti-HCG (polyklonal).

Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 2,0.

Beispiel 18

45

Markierung von polyklonalem anti-CEA mit dem Ru-Komplex [RC-8]

Für die Kopplungsreaktion werden die folgenden Stammlösungen hergestellt:

1) 1,71 mg/ml Ru-Komplex [RC-8] in Wasser bei pH 4,5.

2) 2,17 mg/ml polyklonales anti-CEA vom Kaninchen (DAKO Code No. A115, Lot 112B) in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

Die Kopplungsreaktion wird nach dem im Beispiel 11 beschriebenen Verfahren durchgeführt. Man verwendet hierzu jeweils 400 µl von den Stammlösungen 1 und 2 sowie 0,19 mg vom wasserlöslichen Carbodimid.

Die markierten Antikörper wurden - wie in Beispiel 11 beschrieben - durch Gelchromatographie vom Ueberschuss an Ru-Komplex [RC-8] abgetrennt.

Die UV-spektroskopische Bestimmung des Gehaltes an anti-CEA und an Ru-Komplex ergab folgende Werte:

50

Markierung von h-IgG mit dem Ru-Komplex [RC-1]

Für die Kopplungsreaktion werden die folgenden Stammlösungen hergestellt:

1) 4,0 mg/ml Ru-Komplex [RC-1] in Wasser bei pH 4,5

2) 6,0 mg/ml h-IgG in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

Die Kopplungsreaktion erfolgt nach dem in Beispiel 11 beschriebenen Verfahren. Dabei werden jeweils 400 µl von den Stammlösungen 1 und 2 sowie 1,11 mg vom wasserlöslichen Carbodimid verwendet.

Die markierten Antikörper wurden - wie in Beispiel 11 beschrieben - durch Gelchromatographie vom Ueberschuss an Ru-Komplex [RC-1] abgetrennt.

Die UV-spektroskopische Bestimmung des Gehaltes an h-IgG und an Ru-Komplex ergab folgende Werte:

10,4 x 10⁻⁶ M Ru-Komplex

1,8 x 10⁻⁶ M h-IgG

Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 5,8.

17

Beispiel 21Markierung von h-IgG mit dem Ru-Komplex [RC-10]

Für die Kopplungsreaktion werden die folgenden Stammlösungen hergestellt:

1) 28,0 mg/ml Ru-Komplex [RC-10] in Wasser bei pH 4,5

2) 6,0 mg/ml h-IgG in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

Die Kopplungsreaktion erfolgt nach dem in Beispiel 11 beschriebenen Verfahren. Dabei werden 526 µl von der Stammlösung 1 und 400 µl von der Stammlösung 2 sowie 7,45 mg vom wasserlöslichen Carbodiimid verwendet.

Die markierten Antikörper werden - wie in Beispiel 11 beschrieben - durch Gelchromatographie vom Ueberschuss an Ru-Komplex [RC-10] abgetrennt.

Die UV-spektroskopische Bestimmung des Gehaltes an h-IgG und an Ru-Komplex ergab folgende Werte:

0,81 x 10⁻⁶ M/l Ru-Komplex

0,78 x 10⁻⁶ M/l h-IgG

Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 1,0.

Beispiel 22Markierung von h-IgG mit dem Ru-Komplex [RC-3]

Für die Kopplungsreaktion werden die folgenden Stammlösungen hergestellt:

1) 3,7 mg/ml Ru-Komplex [RC-3] in Wasser bei pH 4,5

2)

6,0 mg/ml h-IgG in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

Die Kopplungsreaktion erfolgt nach dem in Beispiel 11 beschriebenen Verfahren. Dabei werden jeweils 400 µl von den Stammlösungen 1 und 2 sowie 0,75 mg vom wasserlöslichen Carbodiimid verwendet.

Die markierten Antikörper werden - wie in Beispiel 11 beschrieben - durch Gelchromatographie vom Ueberschuss an Ru-Komplex [RC-3] abgetrennt.

Die UV-spektroskopische Bestimmung des Gehaltes an h-IgG und an Ru-Komplex ergab folgende Werte:

4,41 x 10⁻⁶ M/l Ru-Komplex

1,21 x 10⁻⁶ M/l h-IgG

Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 3,6.

Beispiel 23Markierung von h-IgG mit dem Ru-Komplex [RC-4]

Für die Kopplungsreaktion werden die folgenden Stammlösungen hergestellt:

1) 3,81 mg/ml Ru-Komplex [RC-4] in Wasser bei pH 4,5

2) 6,0 mg/ml h-IgG in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

Die Kopplungsreaktion erfolgt nach dem in Beispiel 11 beschriebenen Verfahren. Dabei werden jeweils 400 µl von den Stammlösungen 1 und 2 sowie 0,75 mg vom wasserlöslichen Carbodiimid verwendet.

Die markierten Antikörper werden - wie in Beispiel 11 beschrieben - durch Gelchromatographie vom Ueberschuss an Ru-Komplex [RC-4] abgetrennt.

Die UV-spektroskopische Bestimmung des Gehaltes an h-IgG und an Ru-Komplex ergab folgende Werte:

5,51 x 10⁻⁶ M/l Ru-Komplex

1,17 x 10⁻⁶ M/l h-IgG

Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 4,70.

Beispiel 24Markierung von h-IgG mit dem Ru-Komplex [RC-5]

Für die Kopplungsreaktion werden die folgenden Stammlösungen hergestellt:

1) 3,87 mg/ml Ru-Komplex [RC-5] in Wasser bei pH 4,5

2) 6,0 mg/ml h-IgG in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

Die Kopplungsreaktion erfolgt nach dem in Beispiel 11 beschriebenen Verfahren. Dabei werden jeweils 400 µl von den Stammlösungen 1 und 2 sowie 0,75 mg vom wasserlöslichen Carbodiimid verwendet.

Die markierten Antikörper werden - wie in Beispiel 11 beschrieben - durch Gelchromatographie vom Ueberschuss an Ru-Komplex [RC-5] abgetrennt.

Die UV-spektroskopische Bestimmung des Gehaltes an h-IgG und an Ru-Komplex ergab folgende Werte:

11,7 x 10⁻⁶ M/l Ru-Komplex

1,04 x 10⁻⁶ M/l h-IgG

Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 11,2.

Beispiel 25Markierung von h-IgG mit dem Ru-Komplex [RC-8]

Für die Kopplungsreaktion werden die folgenden Stammlösungen hergestellt:

1) 3,45 mg/ml Ru-Komplex [RC-8] in Wasser bei pH 4,5

2) 6,0 mg/ml h-IgG in 200 mM NaHCO₃; pH 8,5.

Die Kopplungsreaktion erfolgt nach dem in Beispiel 11 beschriebenen Verfahren. Dabei werden jeweils 400 µl von den Stammlösungen 1 und 2 sowie 0,375 µl vom wasserlöslichen Carbodiimid verwendet.

Die markierten Antikörper werden - wie in Beispiel 11 beschrieben - durch Gelchromatographie vom Ueberschuss an Ru-Komplex [RC-8] abgetrennt.

Die UV-spektroskopische Bestimmung des Gehaltes an h-IgG und an Ru-Komplex ergab folgende Werte:

5,69 x 10⁻⁶ M/l Ru-Komplex

0,45 x 10⁻⁶ M/l h-IgG

Dies entspricht einem Markierungsgrad MG von 12,8.

Ansprüche

1. Rutheniumkomplexe, an die ein immunologisch aktives Material gekoppelt ist, wobei die Rutheniumkomplexe die allgemeine Formel



aufweisen, worin L₁, L₂ und L₃ gleich oder verschieden sind und je einen bi- oder polycyclischen Liganden mit mindestens zwei stickstoffhaltigen Heterocyclen bedeuten, wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer wasserlöslich machenden Gruppe substituiert ist, und wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer reaktiven Gruppe, gegebenenfalls über eine Spacergruppe, substituiert ist, und wobei die Liganden L₁, L₂ und L₃ über Stickstoffatome an das Ruthenium gebunden sind.

2. Rutheniumkomplex nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Liganden L_1 bzw. L_2 2,2'-Bipyridin-, 1,10-Phenanthrolin-, Bathophenanthrolin- oder Benzbathophenanthrolin-gruppen enthalten.

3. Rutheniumkomplex nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Liganden L_1 bzw. L_2 Bathophenanthrolin sind und mit Sulfonsäuregruppen als wasserlöslich machende Gruppen substituiert sind.

4. Rutheniumkomplex nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Sulfonsäuregruppen in Form der Salze vorliegen.

5. Rutheniumkomplex nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ligand L_1 eine 2,2'-Bipyridin-, 1,10-Phenanthrolin-, Bathophenanthrolin- oder Benzbathophenanthrolin-gruppe enthält.

6. Rutheniumkomplex nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Ligand L_1 eine Bathophenanthrolin- oder Benzbathophenanthrolin-gruppe enthält, die mit mindestens einer Alkylengruppe mit höchstens 8 C-Atomen substituiert ist, die gegebenenfalls -SO₃-NH₂, -S-, -O-, -COO-, oder -CO-NH- aufweisen kann.

7. Rutheniumkomplex nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Alkylengruppe endständig mit einer -COOH, -NH₂, -NCS, -J oder -SO₃Hal Gruppe substituiert ist.

8. Rutheniumkomplex nach einem der Ansprüche 6-7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ligand L_1 die Gruppe -SO₃-NH(CH₂)_n-COOH enthält, wobei n eine ganze Zahl von 1-6 bedeutet.

9. Rutheniumkomplex nach einem der Ansprüche 6-7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ligand L_1 die Gruppe -(CH₂)_n-COOH enthält.

10. Rutheniumkomplex nach einem der Ansprüche 6-7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ligand L_1 die Gruppe -(CH₂)_n-COOH enthält.

11. Rutheniumkomplex nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Ligand L_1 2,2'-Bipyridin ist, der mit mindestens einer Carboxylgruppe substituiert ist.

12. Rutheniumkomplex nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Liganden L_1 , L_2 und L_3 gleich sind und Bathophenanthrolin darstellen, die sowohl mit einer wasserlöslich machenden Gruppe als auch über eine Spacergruppe mit einer reaktiven Gruppe substituiert sind.

13. Rutheniumkomplex nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die wasserlöslich machende Gruppe eine Sulfonsäuregruppe ist und dass die reaktive Gruppe eine Carboxylgruppe ist, die über eine -SO₃-NH-(CH₂)_n-Spacergruppe verknüpft ist.

14. Rutheniumkomplex nach einem der Ansprüche 1-13, dadurch gekennzeichnet, dass das immunologisch aktive Material ein Antigen oder Hapten ist.

15. Rutheniumkomplex nach einem der Ansprüche 1-13, dadurch gekennzeichnet, dass das immunologisch aktive Material ein Antikörper ist.

16. Rutheniumkomplex nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das immunologisch aktive Material ein Antikörper gegen carcinoembryonales Antigen, humanes Choriongonadotropin oder α -Interferon ist.

17. Verfahren zur Herstellung eines Rutheniumkomplexes gemäß allgemeiner Formel I von Patentanspruch 1, an den ein immunologisch aktives Material gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass man den Rutheniumkomplex gemäß allgemeiner Formel I in an sich bekannter Weise mit einem immunologisch aktiven Material koppelt.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass man als Kopplungsmittel N-Cyclohexyl-N'-(2-morpholinoethyl)-carbodiimid methyl-p-toluolsulfonamid verwendet.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass man als immunologisches Material Antikörper gegen carcinoembryonales Antigen, humanes Choriongonadotropin oder α -Interferon verwendet.

20. Verwendung eines Rutheniumkomplexes nach einem der Ansprüche 1-13 in einem Fluoreszenzimmunoassay.

21. Verwendung eines Rutheniumkomplexes nach einem der Ansprüche 1-13 in einem Fluoreszenzimmunoassay mit zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung.

22. Rutheniumkomplex der allgemeinen Formel



worin L_1 , L_2 und L_3 gleich oder verschieden sind und je einen bi- oder polycyclischen Liganden mit mindestens zwei stickstoffhaltigen Heterocyclen bedeuten, wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer wasserlöslich machenden Gruppe substituiert ist, und wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer reaktiven Gruppe, gegebenenfalls über eine Spacergruppe, substituiert ist, und wobei die Liganden L_1 , L_2 und L_3 über Stickstoffatome an das Ruthenium gebunden sind.

23. Rutheniumkomplex gemäß Anspruch 22, worin die Liganden L_1 , L_2 und L_3 die in den Ansprüchen 2-13 erwähnten Bedeutungen haben.

Ansprüche für AT

1. Verfahren zur Herstellung eines Rutheniumkomplexes gemäß allgemeiner Formel



worin L_1 , L_2 und L_3 gleich oder verschieden sind und je einen bi- oder polycyclischen Liganden mit mindestens zwei stickstoffhaltigen Heterocyclen bedeuten, wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer wasserlöslich machenden Gruppe substituiert ist, und wobei mindestens einer dieser Liganden mit mindestens einer reaktiven Gruppe, gegebenenfalls über eine Spacergruppe, substituiert ist, und wobei die Liganden L_1 , L_2 und L_3 über Stickstoffatome an das Ruthenium gebunden sind, an den ein immunologisch aktives Material gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass man den Rutheniumkomplex gemäß allgemeiner Formel I in an sich bekannter Weise mit einem immunologisch aktiven Material koppelt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als Kopplungsmittel N-Cyclohexyl-N'-(2-morpholinoethyl)-carbodiimid methyl-p-toluolsulfonamid verwendet.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass man als immunologisches Material Antikörper gegen carcinoembryonales Antigen, humanes Choriongonadotropin oder α -Interferon verwendet.